



Formulaire
**Preconisations Test respiratoire
Helicobacter pylori**

Référence : C1-INS10

Version 4

LABM BIOSEVRES

Site de Bressuire

tél. 05 49 65 03 05
48 Bd du Guédeau
79300 BRESSUIRE

Site de Thouars

tél. 05 49 66 26 37
2 Bd Bergeon
79100 THOUARS

Site de Thouars Porte de Paris

tél 05 49 66 17 07
38 rue Porte de Paris
79100 THOUARS

Intérêt : cet examen permet l'évaluation de l'éradication de la bactérie après traitement. Ce test est réalisé au laboratoire.

PRECONISATIONS POUR LE RECUEIL

Le test doit être réalisé après :

- Arrêt de tout traitement antibiotique depuis **au moins 4 semaines**.
- Arrêt des inhibiteurs de la pompe à protons depuis **au moins 2 semaines** (Oméprazole : Mopral,..., Esoméprazole : Inexium,..., Rabéprazole : Pariet,...).
- Arrêt des anti-acides et pansements gastro-intestinaux depuis **au moins 24 heures** (Maalox, Rennie, Smecta,...).

Protocole :

- Le patient doit **être à jeun depuis la veille, au repos**.
- Le patient **ne doit pas avoir bu, ni mangé, ni fumé** dans les 6 heures avant le test (ni pendant).
- Le patient **doit apporter au laboratoire** les produits prescrits par son médecin ; les prendre en pharmacie.
- Le patient doit prévoir 45 minutes de présence au laboratoire (recueil d'air expirée à T0 et T30).



Formulaire
**Preconisations Test respiratoire
Helicobacter pylori**

Référence : C1-INS10

Version 4

LABM BIOSEVRES

Site de Bressuire

tél. 05 49 65 03 05
48 Bd du Guédeau
79300 BRESSUIRE

Site de Thouars

tél. 05 49 66 26 37
2 Bd Bergeon
79100 THOUARS

Site de Thouars Porte de Paris

tél 05 49 66 17 07
38 rue Porte de Paris
79100 THOUARS

Intérêt : cet examen permet l'évaluation de l'éradication de la bactérie après traitement. Ce test est réalisé au laboratoire.

PRECONISATIONS POUR LE RECUEIL

Le test doit être réalisé après :

- Arrêt de tout traitement antibiotique depuis **au moins 4 semaines**.
- Arrêt des inhibiteurs de la pompe à protons depuis **au moins 2 semaines** (Oméprazole : Mopral,..., Esoméprazole : Inexium,..., Rabéprazole : Pariet,...).
- Arrêt des anti-acides et pansements gastro-intestinaux depuis **au moins 24 heures** (Maalox, Rennie, Smecta,...).

Protocole :

- Le patient doit être à jeun depuis **la veille, au repos**.
- Le patient **ne doit pas avoir bu, ni mangé, ni fumé** dans les 6 heures avant le test (ni pendant).
- Le patient **doit apporter au laboratoire** les produits prescrits par son médecin ; les prendre en pharmacie..
- Le patient doit prévoir 45 minutes de présence au laboratoire (recueil d'air expirée à T0 et T30).