



Cette liste comprend les examens réalisés au Laboratoire Biosevres et les examens les plus courants transmis au Laboratoire Biomnis.

Elle est consultable et imprimable :

- Sur le site Internet du Laboratoire <http://laboratoire-biosevres.fr/>
- Sur notre Manuel de prélèvement en ligne <http://biosevres.manuelprelevement.fr/>

Les informations exhaustives concernant les examens transmis sont disponibles sur le site Internet du Laboratoire Biomnis, accessible depuis la page d'accueil de notre Manuel de prélèvement.

1. EXAMENS A JEUN	2
2. HORAIRE A RESPECTER :	2
3. PRELEVEMENT AU LABORATOIRE IMPERATIVEMENT	3
4. PRELEVEMENT AU LABORATOIRE DE PREFERENCE	4
5. PROTOCOLE SPECIFIQUE	4
6. PRELEVEMENTS EFFECTUES PAR LE PATIENT	4
7. PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES	5
8. TEST RESPIRATOIRE HELICOBACTER PYLORI (au laboratoire)	5
9. TEST DE HUHNER (au laboratoire)	5
10. PRELEVEMENTS SPECIAUX	5
11. EXAMENS TRANSMIS NON CITES PLUS HAUT	5



1. EXAMENS A JEUN

Voir [C2-ENR03-Liste des examens à effectuer sur patients à jeun](#).

2. HORAIRE A RESPECTER

Analyses sanguines principales dont la réalisation nécessite le respect de l'horaire de prélèvement (rythme circadien, administration de médicaments, ...) :

- ACTH : à 8h (en pratique, avant 9h, sauf prescription contraire), au laboratoire
- Activité Anti Xa, prélèvement :
 - 3 à 4 heures après l'injection sous-cutanée de Lovenox®, Fragmine®, Fraxiparine®, Clivarine®
 - 4 à 6 heures après l'injection sous-cutanée d'Innohep® ou Fraxodi®
 - Au milieu entre 2 injections sc pour Calciparine
 - 6h après début traitement ou 1 à 6h après modification de dose pour Héparine IV
- Cortisol : à 8h (en pratique, avant 9h, sauf prescription contraire)
- Prolactine : prélèvement après 30 minutes de repos
- PTH (parathormone) : matin (sauf prescription contraire)
- Médicaments : voir fiche examen dans manuel de prélèvement Biosevres ou Biomnis

Dans tous les cas, il est indispensable d'indiquer l'heure de prélèvement car elle est nécessaire à l'interprétation des résultats pour de nombreux examens.

De très nombreux paramètres sont soumis à un rythme circadien plus ou moins important.

Il peut arriver qu'il soit nécessaire, dans certaines situations cliniques, de contrôler des examens dans des conditions de respect plus strict de ces rythmes.



3. PRELEVEMENT AU LABORATOIRE IMPERATIVEMENT

Certains examens doivent **impérativement être prélevés au laboratoire** pour diverses raisons : délai de stabilité, congélation à réaliser dans l'heure, tube de prélèvement spécifique, traitement pré-analytique particulier, ...

3.1 Examens réalisés au laboratoire Biosevres

Voir Manuel de prélèvement / Préconisations de prélèvement / [C2-MO01-Prélèvements sanguins](#)

- Cannabis et autres drogues
- Cryoglobuline
- Cryofibrinogène
- Hyperglycémie provoquée par voie orale
- Test respiratoire Helicobacter pylori
- Examens urinaires prescrits par la Préfecture, Commission des permis de conduire ...

3.2 Examens transmis (les plus courants, liste non exhaustive)

- Acide lactique - Acide oxalique - Acide pyruvique
- ACTH
- ADH – Hormone antidiurétique
- Agglutinines froides
- Ammoniémie
- Angiotensine II
- Anticoagulant circulant
- Anticorps anti-facteurs de coagulation : VII, VIII, IX, XI, ...
- Calcium ionisé
- Catécholamines plasmatiques
- Cordarone (Amiodarone)
- Complément hémolytique total – CH 50
- Dérivés méthoxylés des catécholamines
- Drogues
- Facteurs de coagulation : II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, ...
- Facteur Willebrand
- Fibromax
- Fibromètre
- Gastrine
- Inhibines A et B
- Lithium érythrocytaire
- Plasminogène
- Protéine C
- Protéine S
- Résistance à la protéine C activée
- Sérotonine
- Trypsine
- VIH Génotypage
- Vitamine A – Rétinol
- Vitamine C
- Métaux : Aluminium, Cuivre, Zinc ...

4. PRELEVEMENT AU LABORATOIRE DE PREFERENCE



Liste non exhaustive des examens transmis les plus courants devant être **congelés dans les 4 heures** suivant le prélèvement (arrivée au laboratoire dans les 3 heures)

- Acide hyaluronique
- Aldostérone : préciser si prélèvement debout (après une heure de déambulation) ou couché (au moins 2 heures)
- Anticorps anti-insuline
- Bromazepam
- **Calcitonine (à jeun)**
- Chromogranine A
- Cross-laps sérum à jeun (urines : 1^{ère} ou 2^{ème} miction du matin à jeun, congelé dans les 4 h)
- GH – Hormone de croissance – STH
- HCG chaînes libres
- Hépatite B : ADN, charge virale, génotypage
- Hépatite C : ARN, charge virale
- Hépatite Delta : ARN, charge virale
- Homocystéine
- IGF-1 – Somatomédine C
- Méthadone
- Opiacés serum
- Rénine active – ARP – Activité Rénine plasmatique : préciser si prélèvement debout (après une heure de déambulation) ou couché (au moins 2 heures)
- Test au Synacthène
- Testostérone libre et biodisponible
- VIH : charge virale
- Vitamines B1, B6, E

5. PROTOCOLE SPECIFIQUE

Voir Manuel de prélèvement / Préconisations de prélèvement / [C2-MO01-Prélèvements sanguins](#)

6. PRELEVEMENTS EFFECTUES PAR LE PATIENT

Voir Manuel de prélèvement / Préconisations pour le patient

- Auto-prélèvement vaginal pour recherche de Chlamydia trachomatis
- Expectorations
- Examens d'urines : ECBU, HLM, urines de 24 h ou échantillon, Chlamydiae, Urocytogramme
- Examens de selles : coproculture, parasitologie
- Spermogramme, spermoculture

7. PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES

Voir Manuel de prélèvement / Préconisations de prélèvement / [C2-MO03-Prélèvements bactériologiques](#)

8. TEST RESPIRATOIRE HELICOBACTER PYLORI (au laboratoire)

Voir [C2-MO06-test respiratoire helicobacter pylori](#)

9. TEST DE HUHNER (au laboratoire)

Voir [C2-MO04-Test de Hühner](#)



10. PRELEVEMENTS SPECIAUX

Voir [C2-MO07-Prélèvements spéciaux](#)

11. EXAMENS TRANSMIS NON CITES PLUS HAUT

Pour les examens transmis à un laboratoire spécialisé non cités plus haut, voir la documentation de ce laboratoire et/ou se renseigner auprès de notre laboratoire.